



FONDAZIONE
IRCCS POLICLINICO "SAN MATTEO"
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico di diritto pubblico
C.F. 00303490189 - P. IVA 00580590180
V.le Golgi, 19 - 27100 PAVIA
Tel. 0382 5011

Preparazione esame di risonanza magnetica con mezzo di contrasto

PREPARAZIONE

Il paziente deve presentarsi il giorno dell'esame a digiuno da almeno 6 ore e con il risultato recente del dosaggio della CREATININEMIA e possibilmente con il calcolo del filtrato glomerulare (massimo 30 giorni precedenti la data di esecuzione dell'esame).

E' consentito assumere l'abituale terapia domiciliare secondo l'indicazione del proprio Medico Curante con acqua.

Presentarsi all'esame senza piercing, orecchini.

Si raccomanda di portare tutta la documentazione clinica e radiologica in possesso.

CONTROINDICAZIONI

Per presenza di elementi all'interno del corpo: pace maker, neurostimolatore, pompa ad infusione, schegge metalliche, pallini da caccia, corpi estranei metallici, anamnesi di esposizione professionale a metalli, fratture trattate con mezzi di sintesi metallici, protesi (anca, ginocchio, spalla, gomito, apparato urogenitale....), apparecchi ortodontici fissi, protesi acustiche interne fisse, impianti cocleari, protesi ossiculari, cristallino artificiale, clips metalliche inserite in seguito ad interventi chirurgici (es. interventi in videolaparoscopia, interventi su cuore, addome,....).

Stato di gravidanza.

Presenza di allergie.

In caso di presenza di una controindicazione o in caso di dubbi contattare il proprio Medico Curante.

Nota bene

E' sconsigliata la RM con mezzo di contrasto nei pazienti con filtrato glomerulare <30ml/min.

Se è stato somministrato mezzo di contrasto è sconsigliato sottoporsi nelle 48 ore successive ad una indagine radiologica dell'addome e nei 7 giorni successivi ad un'altra indagine con analogo mezzo di contrasto.

In presenza di una controindicazione o in caso di dubbi contattare il proprio medico curante.

IN CASO DI ALLERGIE NOTE O PREGRESSE AL MEZZO DI CONTRASTO, GRAVI ALLERGIE A FARMACI O SOSTANZE, IN PRESENZA DI INSUFFICIENZA RENALE CRONICA il Medico Curante dovrebbe considerare prioritariamente indagini diagnostiche alternative che non prevedano somministrazione di mezzi di contrasto; se invece è necessario il mezzo di contrasto, si devono ritirare c/o radiologia alcune note specifiche da presentare al curante.