



## NOTA INFORMATIVA PER LA PROCEDURA DI RADIOGRAFIA TRATTO FARINGO-CRICO-ESOFAGEO-CARDIALE CON VIDEOREGISTRAZIONE (STUDIO DELLA DEGLUTIZIONE)

*Gentile Signora, Egregio Signore,*

*un'adeguata informazione rappresenta un elemento indispensabile del percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale.*

*Per tale motivo, vogliamo assicurarLe una buona informazione, che Le permetta di divenire, il più possibile, partecipe dell'impegno comune alla tutela della Sua salute e di affidarsi con consapevolezza alla competenza dei professionisti sanitari.*

*Le indicazioni contenute in questa Nota illustrano modalità di esecuzione, benefici, effetti collaterali e rischi, nonché le valide alternative al trattamento sanitario che Le è stato proposto. Queste spiegazioni tuttavia, in relazione al loro carattere generale, non sostituiscono il più esteso ed articolato colloquio informativo tra Lei ed il medico, che risponderà anche ad ogni Sua ulteriore richiesta di chiarimento.*

*La procedura diagnostica prescritta **Radiografia Tratto Faringo-crico-esofageo.cardiale con videoregistrazione (studio della deglutizione)** trova indicazione in considerazione della sintomatologia riscontrata e del quesito diagnostico formulato dal suo medico curante, in particolare nello studio delle disfagie.*

**La procedura diagnostica consiste** nella somministrazione per via orale di sospensione di solfato di bario purissimo. Viene attualmente utilizzato il Prontobario-HD®, sospensione di solfato di bario predosata e confezionata (circa 100 cc 250% P/V). Si precisa che tale mezzo di contrasto non viene assorbito nel passaggio intestinale e verrà pertanto in seguito eliminato con le feci senza alcuna complicazione possibile.

Sono in seguito assunti radiogrammi in serigrafia rapida atti a documentare la morfologia e la motilità dei tratti in esame, in particolare della cascata delle contrazioni della catena deglutitoria.

Le **difficoltà tecniche** sono rappresentate dalla eventuale difficoltà fisica dell'Utente alla assunzione del contrasto per os o alla modifica delle posizioni sul tavolo radiologico (lo studio è da eseguire in ortostatismo, pertanto con Paziente in stazione eretta o almeno seduto).



I **rischi** connessi alla procedura proposta consistono nella possibile aspirazione del contrasto nel caso di scarsa capacità della deglutizione, caso nel quale peraltro il contrasto baritato può essere sostituito da mezzo di contrasto idrosolubile tipo Gastrografin® o Gastromiro®.

**Non** sussistono **controindicazioni assolute** alla procedura proposta.

**Controindicazione relativa** il sospetto di perforazione intestinale o di occlusione serrata, nel qual caso comunque è possibile sostituire il mezzo di contrasto come già citato al punto precedente.

**Gli eventuali rischi connessi alla non esecuzione** della procedura proposta consistono nella impossibilità di dirimere il dubbio diagnostico formulato dal medico curante.

Non è necessaria una **preparazione** all'esame.

**Non** sussistono significative **complicanze** correlate alla procedura proposta. Il caso di aspirazione del mezzo di contrasto idrosolubile esso viene nel tempo riassorbito ed eliminato per via urinaria.

**Non** sussistono significative **conseguenze** correlate alla procedura proposta.